



「工作和汽油或橡膠等溶劑有關的人比較容易得到巴金森症，而且病況也較嚴重。」在意大利米蘭巴金森病研究院的 Gianni Pezzoli 醫生最近發表的研究報告如此說。這項研究調查 990 位巴金森病患者，結果發現有百分之二十的人員職業和碳氫溶劑有關。他們患巴金森病的時機比一般人大約早三年；而且病況的嚴重程度和接觸碳氫溶劑的程度有直接關係。

碳氫溶劑主要是和石油有關的溶劑，例如油漆、強力膠和橡膠。因此，危險性較高的工作依嚴重性可以排列如下：石油工業、塑膠工業、橡膠工業、油漆、

與巴金森病有關的職業

傢俱製造、汽車修護、印刷業、皮革業、化學界、纖維工業、織造業、農業和冷氣業。

那麼，要怎樣避免碳氫溶劑的影響呢？Pezzoli 醫生建議在上列行業工作人員採取下述措施：

1. 穿保護性的衣服
2. 注意工作場所要有良好的通風設備
3. 避免皮膚時常和汽油、強力膠、油漆、和殺蟲劑接觸。

事實上，除了工業用的碳氫溶劑以外，家庭用的殺蟲劑也有研究指出會增加得巴金森病症的機率。這原因可能是這些石化產品可能會導致腦細胞或神經細胞的死亡。雖是如此，這結果顯示有需要作進一步的調查。🕒

參考資料：

1. BBC News Online, Sept. 11, 2000
2. WebMD News, Sept. 11, 2000



能付出愛心的人最幸福，有感恩心的人最快樂。
有智慧才能歡喜地為人群付出，而不費得辛苦。

靜思小語

