


新藥介紹 Remacemide

最近有實驗結果顯示癲癇症的新藥 **Remacemide** 配合左多巴藥使用時對巴金森病患者有幫助。因為巴金森病是腦內一種稱為穀氨酸鹽(glutamate)的化學物質過於活躍而造成震顫和其他巴金森病的症狀。**Remacemide** 由於能夠抑制穀氨酸鹽的活動，因而能夠減輕巴金森病的症狀和可能延緩其惡化。

在今年四月廿五日出刊的神經學雜誌報導一個有二百位患者參加的實驗，他們不使用左多巴或其他多巴胺製劑(dopaminergic)藥物，而每日服用 0, 150, 300, 或 600 毫克的 **Remacemide** 五星期。服用 0 和 150 毫克的患者有 96%參加全程的實驗，而服用 300 和 600 毫克的患者則有 85%完成實驗。經過對心智，活動能力以及日常生活動作的測試，所有服用 **Remacemide** 的患者都保持穩定的狀況。有些患者在實驗中感覺噁心和昏眩，但是沒有其他嚴重的副作用發生。

本實驗的主持人，美國 Rochester 大學的神經學



家 Steven Schwid 說，「我們的目標是研究出如何安全地使用 Remacemide，如果還能在往後的實驗中證實 Remacemide 能配合多巴胺能的藥來改進患者的症狀，那 Remacemide 將是新一類的巴金森藥。如果它能進一步延緩病症惡化，那將是巴金森病藥物治療的一大重要進展。」

Remacemide 目前還被試驗於急性中風和亨丁頓舞蹈症的患者。❶

本文譯自：

Drug Infoline, Pharminfonet's bimonthly newsletter

本刊前面的期數

常常有讀友來函詢問早期的「巴金森之友」。很抱歉的是，本刊前面幾期因為是試印性質，第一、二期只印了幾百本，現已全部發完。第三期以後可以向台北市中山南路七號台大醫院神經部巴金森病研究室索取。不過，它們的內容都可以在台灣大學附設醫院神經部的網站內「巴金森之友」的項目下找到。或是直接由下列網址找出：

<http://med.mc.ntu.edu.tw/~neuro/>



Requip 和 Mirapex 的副作用

本刊前兩期曾經介紹過新的巴金森病促效劑 Requip 和 Mirapex。最近有幾個研究報告指出它們有一種可能會使某些患者突然昏睡的副作用。這副作用如果發生於患者靜止中時並無大礙，但是如果是在開車或是使用機械中，那問題就大了。

這問題的發現是因為患者發生車禍，而主治醫師發現這些患者以往駕駛記錄良好，而且沒有睡眠的問題，但是他們都服用 Mirapex，平均的服藥時間是七個月。隨後，有些服用 Requip 的患者也有類似狀況。不過，藥量減少或停用後，症狀也就消失。

我們知道服用 Requip 和 Mirapex 有時會讓患者昏昏沉沉，而且巴金森病患者大多有睡眠的問題，有些人因此在白天精神不好或常想睡覺。但是，突然昏睡的狀況是患者一下子覺得很睏，無法抗拒。目前還不知道是什麼原因造成患者會突然昏睡。

目前，全球已經知道有六十件突然昏睡的案例，這狀況並不普遍；不過，藥廠也已經在藥品上加以警告字句，以提醒醫師和患者。如果患者遇到這種情形發生應馬上告訴醫師，不要自行換藥、停止用藥、或減少藥量。Ⓢ

參考資料：

Movement Disorder, Jul, 2000; 15(4): 658-663

