



巴金森患者使用 COVID-19 抗病毒藥物須知

文／編輯小組

巴金森患者通常會長期服藥，萬一確診新冠肺炎（COVID-19），又必須同時使用口服抗病毒藥物。這些藥物之間的關係如何？是否能併用？本文為病友們整理基本注意事項。但，告知醫師目前服用的藥物仍然是首要的。

根據衛生福利部食品藥物管理署提供的資料顯示，現階段國內許可專案輸入的 COVID-19 口服抗病毒藥物有兩種：輝瑞藥廠的 Paxlovid（商品名：倍拉維）及默沙東藥廠的 Molnupiravir（商品名：莫納皮拉韋）。

共病藥物可能引發交互作用

這兩種藥物雖以 Paxlovid（倍拉維）的用藥限制較多，但巴金森的主要治療藥物左多巴、多巴胺促效劑等，並未列於倍拉維中文說明書的禁忌藥物中。然而值得注意的是，



目前治療新冠肺炎的口服及靜脈注射藥劑

| 藥名 | 倍拉維 Paxlovid | 莫納皮拉韋 Molnupiravir | 瑞德西韋 Remdesivir |
|---------|---|--|---|
| 製造商 | 輝瑞 | 默沙東 | 吉立亞 |
| 適用對象 | 輕中症確診者 12 歲以上 40 公斤以上 發病 5 天內 具重症風險因子 | 輕中症確診者 18 歲以上 發病 5 天內 具重症風險因子 | 中重症確診者 12 歲以上 40 公斤以上 發病 7 天內 具重症風險因子 |
| 治療方式 | 口服劑型 | 口服劑型 | 注射劑型 |
| 目前已知副作用 | 黃疸、高血壓、味覺改變、肌肉痠痛、食慾不振、腹部疼痛 | 腹瀉、噁心、暈眩 | 急性肝腎功能損害 |
| 使用禁忌 | 詳中文說明書 | 孕婦不得服用 | 無特定對象 |

巴金森患者若因睡眠、疼痛或憂鬱等症狀而服用此類治療藥物，或是同時有其他慢性疾病等共病的處方藥物（如；心血管疾病用藥、抗免疫用藥等），相對就比較有可能發生藥物交互作用。因此，若經醫師確認需服用新冠肺炎口服抗病毒藥物時，請記得告知開藥醫師您常規服用的藥物種類與藥名，讓醫師幫您評估是否適合服用或是該如何忌避。

開始服藥前應該告知醫生的事

在 Paxlovid 中文說明書中有特別指出「誰

通常不應該服用 Paxlovid？」（詳次頁）但最安全的方式就是在用藥前告知醫師您的**身體狀況及服用中的藥物**，包括：

1. 是否有任何疾病？正在服用哪些藥？例如告訴醫師：我有巴金森，服用某某藥物。
2. 其他使用中的藥物，包括：處方藥、非處方藥、維生素、草藥。最好能列出清單，因為藥物之間的交互作用可能影響藥效或導致嚴重副作用。（Paxlovid 與其他藥物的交互作用清單在中文說明書中有詳列，但一般人較難判斷，還是請醫師把關比較安全。）
3. 是否有過敏？特別是對 nirmatrel-vir、



ritonavir 過敏。至於您是否對 Paxlovid 中的任何成分過敏，須由醫師判斷。

4. 是否有肝臟或腎臟方面的疾病？如有相關病史、病程或用藥，也應提供給醫師參考。

5. 育齡女性若有懷孕、受孕計劃、用避孕藥，或是母乳哺育中，都要告知醫生。

不宜與 Paxlovid 併用的藥物

此外，有些藥物原則上不適合與 Paxlovid 合併使用，因為這些藥物高度依賴 CYP3A 酵素清除作用，其濃度會因使用 Paxlovid 而改變，因此會產生較嚴重的副作用與不良反應。若有以下疾病正在服藥治療，請務必告知醫師，由醫師幫您把關、調整用藥。臺大醫院神經部朱永載醫師幫大家分類整理出來，方便檢視：

心血管系統用藥

- 心律不整藥，如：amiodarone, diltiazem, dronedarone, flecainide, propafenone, digoxin
- 中風病史，且服用抗凝血劑，如：warfarin, rivaroxaban, dabigatran
- 用於高血壓之鈣離子阻斷劑，如：amlodipine, nifedipine, felodipine
- 肺動脈高壓用藥：sildenafil（亦為性功能障礙用藥）

神經系統用藥

- 控制幻覺或鎮靜的抗精神病藥，如：quetiapine, clozapine
- 焦慮或安眠用藥，如：triazolam, midazolam

根據 Paxlovid 使用說明，如果有以下情況，請勿服用 Paxlovid：

- 對 nirmatrelvir、ritonavir 或 Paxlovid 中的任何成分過敏。
- 正在使用以下任何一種藥物：（因為 Paxlovid 與這些藥物一起服用可能會導致嚴重或危及生命的副作用或影響 Paxlovid 的作用方式。）

Alfuzosin；Pethidine、propoxyphene；Ranolazine；Amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine；Colchicine；Lurasidone、pimozide、clozapine；Dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine；Lovastatin、simvastatin；用於肺動脈高壓（PAH）的 sildenafil（Revatio®）；Triazolam、口服 midazolam；Apalutamide；Carbamazepine、phenobarbital、phenytoin；Rifampin；聖約翰草（St. John's Wort 即 hypericum perforatum）

（資料來源：整理自 Paxlovid 中文說明書）

- 特定抗憂鬱劑：trazodone, bupropion
- 傳統抗癲癇藥，如：carbamazepine, phenytoin, phenobarbital

代謝疾病用藥

- 降血脂藥（史他汀類 statin），如：
lovastatin、simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin
- 痛風用藥：秋水仙素（colchicine）

慢性感染用藥

- 其他抗病毒藥用藥，如：抗 HIV 用藥及抗 C 型肝炎藥物
- 抗真菌藥物，如：voriconazole, ketoconazole
- 抗結核菌藥：rifampin

其他

- 免疫抑制劑／抗排斥藥，如：類固醇、cyclosporine, tacrolimus
- 癌症化療藥物，如：vinblastine, vincristine

這些狀況可能是副作用

服藥期間如果身體出現異狀，有可能是服藥導致的副作用，但有些跟巴金森本身的症狀近似（例如：吞嚥困難），自己比較難判斷，也容易輕忽；因此一旦狀況出現，應積極與開藥的醫生討論。

Paxlovid 可能的副作用包括：

一、過敏反應：即使只服用一劑也有可能發生，萬一發生以下過敏症狀，請立即停藥並連絡原開藥的醫療院所：蕁麻疹、吞嚥或呼吸困難、嘴或嘴唇或臉部腫脹、喉嚨發緊、聲音嘶啞、皮疹。

二、味覺改變

三、腹瀉

四、高血壓

五、肌肉疼痛

然而，這些並非 Paxlovid 所有可能的副作用，畢竟 COVID-19 疫情發生才短短不到三年，服用過 COVID-19 抗病毒藥物的人還不算很多，無論是 Paxlovid 或 Molnupiravir，其不可預期的副作用也都可能陸續被發現，因此，密切注意身體變化並積極與醫師討論是必要的。

參考資料



COVID-19 抗病毒藥物中文說明書
可查閱衛生福利部食品藥物管理署網站
<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=11844>



COVID-19 治療用藥領用方案
可查閱衛生福利部食品藥物管理署網站
https://www.cdc.gov.tw/Category/List/Rsel-eiUxo_EaUnzCz11gQ



若想瞭解更多 COVID-19 的資訊，
至衛生福利部疾病管制署網站
<https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXydB0kNSA9A>